

# Vektorové prostory

## Geometrie pro informatiky

Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.



Palacký University, Olomouc

**Struktura vektorového prostoru** Na množině  $U$  je dána struktura vektorového prostoru (nad polem reálných čísel), je-li na ní dána binární operace  $+$  a zobrazení  $\cdot_U : \mathbb{R} \times U \rightarrow U$ . Operace  $+$  a zobrazení  $\cdot_U$  splňují pro každé  $r, s \in \mathbb{R}$  a  $u, v, w \in U$  následující podmínky:

1  $u + v = v + u$

2  $u + v \in U$

3  $(u + v) + w = u + (v + w)$

4  $\exists e \in U : e + u = u + e = u$

5  $\forall u \in U \exists v \in U : u + v = e = v + u$

6  $1 \cdot_U u = u$

7  $r \cdot_U (s \cdot_U u) = (rs) \cdot_U u$

8  $(r + s) \cdot_U u = r \cdot_U u + s \cdot_U u$

9  $r \cdot_U (u + v) = r \cdot_U u + r \cdot_U v$



- **Vektorový prostor** = množina  $U$  spolu se strukturou VP
- **Vektory** = prvky VP
- **Skaláry** = reálná čísla používaná v  $\cdot_U$
- **Sčítání vektorů** = +
- **Nulový vektor** = 0
- **Násobení vektoru skalárem** =  $\cdot_U$
- $r \cdot_U u = r \cdot u = ru$



- **Kanonická struktura VP:**  $\mathbb{R}^n$ ,  $+$  a  $\cdot \mathbb{R}^n$  def. po složkách.
- **Matice**  $m \times n$
- **Polynomy stupně nejvýše**  $n$ :  $P_n$

Ověřte podmínky pro strukturu VP.



Máme VP  $V$ . **Vektorový podprostor  $W$**  je nějaká podmnožina  $V$ , přičemž platí, že  $W$  je také VP.

$W \subseteq V$  musí splňovat pro  $\forall x, y \in W$  a  $a \in \mathbb{R}$  následující podmínky:

**1**  $x + y \in W$

**2**  $a \cdot x \in W$



**Lineární kombinace vektorů**  $u_1, \dots, u_k \in U$  s koeficienty  $r^1, \dots, r^k$  je vektor  $r^1 u_1 + \dots + r^k u_k$ .

O vektorech  $u_1, \dots, u_k$  říkáme, že jsou **lineárně závislé**, pokud existují koeficienty  $r^1, \dots, r^k \in \mathbb{R}$ , z nichž alespoň jeden není nulový, tak, že příslušná lineární kombinace je nulový vektor.

Vektory  $u_1, \dots, u_k$  se nazývají **lineárně nezávislé**, pokud nejsou lineárně závislé.

Jsou-li vektory  $u_1, \dots, u_k$  lineárně nezávislé, pak pro každý vektor  $v \in U$  existuje nejvýše jedna  $k$ -tice čísel  $(r^1, \dots, r^k)$  taková, že  $r^1 u_1 + \dots + r^k u_k = v$ .



Pro vektory  $x_1, \dots, x_n$  zjistíme zda jsou závislé, pokud nalezneme řešení rovnice  $a^1 x_1 + \dots + a^n x_n = 0$ .

**Řešení:**

- soustava rovnic
- Gaussovská eliminační metoda



**Lineárním obalem množiny**  $K \subseteq U$  rozumíme množinu všech lineárních kombinací všech konečných  $n$ -tic vektorů z  $K$  pro všechna přirozená čísla  $n$ . Lineární obal množiny  $K$  značíme  $\langle K \rangle$ . Pokud je množina  $K$  konečná,  $K = \{u_1, \dots, u_k\}$ , značíme jej také  $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$ .

Říkáme, že množina  $K$  **generuje vektorový prostor**  $U$ , pokud  $\langle K \rangle = U$ .

Pokud množina  $\langle u_1, \dots, u_k \rangle$  generuje vektorový prostor  $U$ , má pro libovolné  $v \in U$  rovnice  $r^1 u_1 + \dots + r^k u_k = v$  vždy alespoň jedno řešení.





## Základní vlastnosti:

- Vždy platí  $W \subseteq \langle W \rangle$
- Vždy platí  $\langle W \rangle = \langle \langle W \rangle \rangle$
- Pokud  $W_1 \subseteq W_2$  pak  $\langle W_1 \rangle \subseteq \langle W_2 \rangle$



Mějme neprázdnou podmnožinu  $W$  VP  $V$  splňující  $\langle W \rangle = W$ .

Pro libovolných  $k$  vektorů  $v_1, \dots, v_k \in W$  a libovolných  $k$  čísel  $r^1 \dots r^k \in \mathbb{R}$  vždy platí:

$$r^1 v_1 + \dots + r^k v_k \in W$$

Na  $W$  tím zavádíme strukturu VP zúžením sčítání vektorů a násobení skalárem na  $W$ .

$W$  nazýváme **vektorový podprostor VP  $V$** .



Jsou-li  $U$  a  $V$  VP, lze na množině  $U \times V$  zavést strukturu VP tak, že sčítání vektorů a násobení vektoru skalárem definujeme takto:

$$(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_2, v_1 + v_2)$$

$$r(u, v) = (ru, rv)$$

pro libovolné vektory  $u, u_1, u_2 \in U$ ,  $v, v_1, v_2 \in V$  a číslo  $r \in \mathbb{R}$ .

Vektorový prostor  $U \times V$  se nazývá **součin vektorových prostorů**.



**Báze VP  $V$**  je množina lineárně nezávislých vektorů, jejichž lineárním obalem je VP  $V$ . Uspořádanou  $m$ -tici  $\alpha = (u_1, \dots, u_m)$  vektorů VP  $V$  nazýváme **báze VP**, pokud jsou vektory lineárně nezávislé a pokud množina  $\{u_1, \dots, u_m\}$  generuje VP  $V$ . Báze je minimální množina vektorů jejíž obalem je VP  $V$ .



## Theorem

*Všechny báze VP mají stejný počet prvků.*

Tento počet nazýváme **dimenze báze VP**.

**Standardní báze** =  $\mathbb{R}^n$

$([1, 0, \dots, 0], [0, 1, \dots, 0], \dots, [0, 0, \dots, 1])$

**Nekonečná báze** = báze dimenze 0



- báze není určena jednoznačně
- všechny báze mají stejný počet prvků
- máme-li bázi VP  $V$   $\alpha = \{u_1, \dots, u_n\}$ , pak platí, že libovolný vektor  $v \in V$  lze vyjádřit lineární kombinací vektorů  $u_1, \dots, u_n$

**Souřadnice vektoru  $v$  v bázi  $\alpha$**   $= v_\alpha = (v_\alpha^1, \dots, v_\alpha^n)$

- $(v + w)_\alpha = v_\alpha + w_\alpha$
- $(rv)_\alpha = r \cdot (v_\alpha)$

# Matice přechodu mezi 2 bázemi

- $\alpha = (u_1, \dots, u_n), \bar{\alpha} = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n)$
- $x = a^1 u_1 + \dots + a^n u_n$
- $x = b^1 \bar{u}_1 + \dots + b^n \bar{u}_n$
  
- $\bar{u}_1 = a^{11} u_1 + \dots + a^{1n} u_n, \dots, \bar{u}_n = a^{n1} u_1 + \dots + a^{nn} u_n$

**Matice přechodu od báze  $\bar{\alpha}$  k bázi  $\alpha = M_{\alpha\bar{\alpha}}$**

$$\begin{pmatrix} a^{11} & \dots & a^{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{1n} & \dots & a^{nn} \end{pmatrix}$$

$$v_\alpha = M_{\alpha\bar{\alpha}} v_{\bar{\alpha}}$$



- $M_{\alpha\bar{\alpha}} \cdot M_{\bar{\alpha}\alpha} = E$
- $M_{\bar{\alpha}\alpha'} \cdot M_{\alpha'\alpha} = M_{\bar{\alpha}\alpha}$





$\lambda : U \rightarrow V$  zobrazení VP  $U$  na  $V$ . Toto zobrazení se nazývá **lineární**, jestliže pro každé vektory  $u_1, u_2, u \in U$  a skalár  $r$  platí:

- $\lambda(u_1 + u_2) = \lambda(u_1) + \lambda(u_2)$
- $\lambda(ru) = r\lambda(u)$

$$\lambda(r^1u_1 + r^2u_2) = r^1\lambda(u_1) + r^2\lambda(u_2)$$

**homomorfismus**



- $\lambda(o_U) = o_V$
- **Obraz zobrazení:**  $\lambda(U) = Im(\lambda) = \{v \in V | \exists u \in U : \lambda(u) = v\}$
- **Jádro zobrazení:**  $Ker(\lambda) = \{u \in U | \lambda(u) = o_V\}$
- $dim(Im(\lambda)) + dim(Ker(\lambda)) = dim(U)$

- $\alpha = (u_1, \dots, u_m)$  báze VP  $U$ ,  $u \in U$
- $\lambda(u) = \lambda(u_\alpha^1 u_1 + \dots + u_\alpha^m u_m) = u_\alpha^1 \lambda(u_1) + \dots + u_\alpha^m \lambda(u_m)$
- $\lambda(u_1), \dots, \lambda(u_m) \in V$
- $\lambda(u)$  v bázi  $\beta$ :

$$\lambda(u)_\beta = u_\alpha^1 \lambda(u_1)_\beta + \dots + u_\alpha^m \lambda(u_m)_\beta$$
$$u_\alpha^1 \begin{pmatrix} \lambda(u_1)_\beta^1 \\ \vdots \\ \lambda(u_1)_\beta^m \end{pmatrix} + \dots + u_\alpha^m \begin{pmatrix} \lambda(u_m)_\beta^1 \\ \vdots \\ \lambda(u_m)_\beta^m \end{pmatrix}$$

- $\lambda(u)_\beta = M_{\beta, \alpha}^\lambda \cdot u_\alpha$

$$M_{\beta, \alpha}^\lambda = \begin{pmatrix} \lambda(u_1)_\beta^1 & \dots & \lambda(u_m)_\beta^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(u_1)_\beta^m & \dots & \lambda(u_m)_\beta^m \end{pmatrix}$$

**Matice lineárního zobrazení  $\lambda$  vzhledem k bázím  $\alpha$  a  $\beta$**



- **Lineární transformace vektorového prostoru:**  $\lambda : U \rightarrow U$
- **Matice lineární transformace  $\lambda$  vzhledem k bázi  $\alpha$ :**  $M_{\alpha,\alpha}^{\lambda} = M_{\alpha}^{\lambda}$